

03CM93-P0412N 改訂年月2009年9月

呼吸の管理（ため、経過観察を行うなどの一般的な対応療法を実施してください。
重篤な症状が発現した場合には、血圧ならびに気道等を確保した上で血圧及び

（先生方）

担当医師名： TEL ()

担当医師名： TEL ()

診療社名： _____

病院・医科名： _____

あなたの担当医師の電話番号

※このカードは必ず常に携帯してください。

C A U T I O N

ザイアジェン®錠300mg/エブジコム®配合錠を服用する患者さんへ

ザイアジェン®錠300mg
(アバカビル硫酸塩錠)



エブジコム®配合錠
(ラミブジン・アバカビル硫酸塩製剤)



※このカードは必ず常に携帯してください。



アバカビルを成分として含むザイアジェン®錠300mgまたはエブジコム®配合錠を服用すると、過敏症^{かひんししょう}が起こる場合があります。

過敏症^{かひんししょう}が発現した患者さんがザイアジェン®錠300mgまたはエブジコム®配合錠の服用を続けると、生命にかかわる重大な事態となる場合があります。

次のような場合は、ただちに担当医師に連絡し、服用を中止するべきかどうか指示を受けてください。

1. 発疹^{はっしん}が起こった場合

2. 下記の4つのグループのうち2つ以上のグループにあてはまる症状が起こった場合

- 発熱
- 吐き気、嘔吐、下痢、腹痛
- ねむけ、倦怠感、筋肉や関節の痛み、頭痛
- 息切れ、のどの痛み、せき

このような過敏症^{かひんししょう}のためにこのくすりの服用を中止した場合は、その後絶対にアバカビルを含むくすり（ザイアジェン®錠300mgまたはエブジコム®配合錠）を服用しないでください。

このような過敏症^{かひんししょう}を経験した人がこのくすりを再び服用すると、数時間以内に強い過敏症^{かひんししょう}の症状があらわれ、生命にかかわるほどの血圧低下^{けつあつていしか}をきたしたり、死亡するおそれがあります。

