

服薬スケジュール表

NNRTI

ストックリン(EFV)
③



ピラミューン(NVP)
①or②



or

PI

レクシヴァ(FPV)
②or④



カレトラ(LPV/RTV)
④



+

レイアタツ(ATV)
②



ノーピア(RTV)
①or②



*

NRTI

エブジコム(ABC/3TC)
①



ツルバダ(TDF/FTC)
①



コンビルド(ABZ/3TC)
②



ビリアード(TDF)
①



レトロビル(AZT)
⑤or⑥



ザイアジェン(ABC)
②



エビビル(3TC)
150mg② or 300mg①



エムトリバ(FTC)
①



- 睡眠 起床 就寝
- 食事 朝 昼 夜
- 通勤 出社 帰宅 イベント
- 抗ウイルス薬以外

□内の数字は1日投与剤数の参考です。 **qd** 1日1回投与可能な薬剤 **⊗** 食事の影響なし * PIの血中濃度を上げるブースターとして併用

生活スケジュール


平日

休日

抗ウイルス薬以外

服薬スケジュール

抗ウイルス薬



あなたの処方

	+		+		+	
--	---	--	---	--	---	--

飲み方(回数・タイミングなど)

◆起こる可能性のある主な副作用

副作用名	起こりやすい時期	症状・対処法など

◆飲み方、生活面、保管・携帯方法などの注意点

--

◆飲み忘れたときの対処方法、飲み忘れ・間違い防止のポイントなど

--

連絡先

病院名

TEL.

主治医：

TEL.

薬剤師：

TEL.

看護師：

TEL.

PI

レクシヴァ
(FPV)

レイアタツ
(ATV)
150mg

カレトラ
(LPV/RTV)

ノービア
(RTV)

ストックリン
(EFV)




GlaxoSmithKline

03CM0044-D0801N
作成年月2008年1月

NRTI

コンビルビル (AZT/3TC) レトロビル (AZT) ザリアジェン (ABC)



NRTI

エムトリバ (FTC)



PI

レイアタッツ (ATV)
200ng



NNRTI

ビラミューン (NVP)



NRTI

エブジコム
(ABC/3TC)

ツルバダ
(TDF/FTC)

ビリアード
(TDF)

エピビル
(3TC)
300mg

エピビル
(3TC)
150mg



睡眠

食事

通勤

イベント

起床

就寝

朝

昼

夜

出社

帰宅



抗ウイルス薬以外



blank

