

LEXIVA

Manual de
LEXIVA
(uso oral)

LEXIVA

Clinic-Hospital

Editorial supervisor:
Dr. Yasuyuki Yamamoto, Lecturer, Department of Laboratory Medicine, Tokyo Medical University

 **GlaxoSmithKlineK.K.**
Do more, feel better, live longer

LXXT0006-P0807N
Issued in July 2008

Introducción

Este “Manual de LEXIVA” contiene las explicaciones sobre las características farmacológicas, posología y forma de administración y las precauciones que deben tomar las personas que van a iniciar el tratamiento con LEXIVA 700.

Si tuviera alguna duda en relación con este medicamento o sobre el tratamiento consulte a cualquier persona del equipo médico ya sea su médico, enfermera o farmacéutico responsable. Si después de comenzar con el uso de este medicamento ocurriera algún cambio en su estado físico o tuviera alguna preocupación, no pare de tomar el medicamento ni disminuya la cantidad del mismo por cuenta propia, comuníquese sin falta con el equipo médico.

Siéntase libre de consultar con su médico todo aquello que le preocupe por insignificante que ello le parezca. El personal médico siempre estará a su disposición para ayudarle.



¿Qué es LEXIVA?

Nombre de marca Lexiva 700 comprimidos

Nombre genérico FOSAMPRENAVIR Cálcico

~~(name of the ingredients)~~

Composición LEXIVA 700 comprimidos contiene un componente llamado FOSAMPRENAVIR Cálcico que después de ser ingerido es metabolizado y se transforma en una sustancia que posee efecto antiviral llamada FOSAMPRENAVIR. Una tableta de LEXIVA contiene 700 mg de FOSAMPRENAVIR.

Acción Terapéutica Lexiva es un fármaco inhibidor de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Este medicamento debe ser utilizado siempre en combinación con otros antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH.

Presentación Es una tableta de color rosa pálido (de unos 20.5 mm de diámetro) que tiene grabado “GXLL7” en su superficie.



~~(Actual size)~~



Indicación Es un medicamento indicado en el tratamiento de la infección causada por el VIH. Su acción impide la replicación del virus, reduciendo la cantidad de virus en la sangre y evitando la deficiencia inmunológica.

Condiciones de conservación y almacenamiento mantener el envase bien cerrado, en lugar seco, fuera del alcance de los rayos de sol y a temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados. Mantener este medicamento lejos del alcance de los niños.

Dosis y Administración

Existen tres dosis diferentes de este medicamento que se indican a continuación. El equipo médico elegirá la dosis más adecuada para usted. Deberá tomar siempre este medicamento siguiendo la indicación de su médico.



Dosis (1)

Tomar un comprimido de LEXIVA 700 mg en combinación con una cápsula de NORVIR (Nombre genérico: RITONAVIR, medicamento anti-VIH) dos veces al día.



Dosis (2)

Tomar dos comprimidos de LEXIVA 700 mg en combinación con dos cápsulas de NORVIR (Nombre genérico: RITONAVIR) una vez al día.



Dosis (3)

Tomar dos comprimidos de LEXIVA 700 mg dos veces al día.



Se debe tomar este medicamento con un vaso de agua fría o tibia, antes o después de las comidas o con el estómago vacío, todos los días siempre en el horario establecido por el médico.

Horario de la toma

Para que usted pueda tomar correctamente este medicamento todos los días es importante determinar el horario de la toma junto con el personal médico, ya sea su médico, enfermera o farmacéutico responsable. En esa ocasión debe explicarles todo lo que hace durante los días laborables, feriados y de descanso. Si después de comenzar a tomar este medicamento ocurre un cambio en su vida cotidiana, en su trabajo u otros motivos y esto le ocasiona dificultades para tomarlo en el horario previamente establecido, consulte sin falta con el personal médico para cambiar el horario a otro más conveniente para usted.

No juzgue por si mismo

No deje de tomar este medicamento, no disminuya la dosis a su juicio aún cuando comience a sentirse mejor. Debe consultar siempre a su médico o al farmacéutico responsable. También debe hacerlo en caso de tener algún efecto colateral.

Si se ha olvidado de tomar una dosis del medicamento

Es necesario tomar diariamente el medicamento para el tratamiento de la infección causada por el VIH. Si se da cuenta de que se olvidó de tomar una dosis, tómela en ese momento. No obstante, si ya está cerca del horario de la próxima dosis, saltee la dosis olvidada y tome el medicamento en el horario determinado por el médico. Nunca tome dos dosis juntas de este medicamento. Si se altera la secuencia de dosificación o ante cualquier duda consulte con su médico o al farmacéutico responsable.



Precauciones

Alimentos

Puede tomar este medicamento antes o después de la comida o con el estomago vacío pues produce los mismos efectos. No tiene que preocuparse por el contenido de los alimentos. Cuide de su cuerpo e intente consumir alimentos bien balanceados.

Interacciones medicamentosas

Si toma en forma conjunta este medicamento con otro puede causarle reacciones adversas. Por eso comuníquese a su médico si se encuentra recibiendo otra medicación, tanto sea de venta libre o indicada. En caso de desear tomar algún medicamento por una gripe u otros motivos, consulte siempre con su médico o al farmacéutico responsable antes de hacerlo.

Alimentos naturales / Suplementos

Existen suplementos, hierbas o alimentos naturales que pueden interferir con este medicamento y causarle algún malestar por eso si desea tomarlos, consulte siempre con su médico o al farmacéutico responsable antes de hacerlo.

Información para el paciente

Comuníquese a su médico si usted ha tenido alguna vez reacciones alérgicas al tomar algún medicamento en el pasado como erupción cutánea o fiebre.

- Informe a su médico si se encuentra embarazada o esta amamantando.
- También si tiene alguna enfermedad específica.
- Debe informar siempre si esta tomando algún medicamento, alimento natural o suplementos.



Reacciones Adversas

La aparición de efectos indeseables, llamados efectos colaterales no es igual de persona a persona. Hay casos en que la persona puede presentar alguno de ellos y otros en que no presenta ninguno. Cuando sienta alguna anomalía en su cuerpo o algo diferente a lo habitual, consulte de inmediato con su médico o al farmacéutico responsable.

Los efectos colaterales de este medicamento son los siguientes: **Erupción cutánea, picor, dolores de cabeza, síntomas del aparato digestivo (pérdida del apetito, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal), sensación de cansancio, etc.**

Si aparecen otros síntomas distintos a los arriba mencionados consulte de inmediato con su médico o al farmacéutico responsable.

Aunque no tenga ningún síntoma puede ocurrir que los valores del colesterol o de la función hepática se encuentren alterados, por eso trate de concurrir periódicamente al hospital a hacerse los análisis necesarios para su control.

