

LEXIVA

เอกสารกำกับการใช้
ยาเลคซีวา (LEXIVA)
(ยาใช้รับประทาน)

LEXIVA

Clinic·Hospital

Editorial supervisor:
Dr. Yasuyuki Yamamoto, Lecturer, Department of Laboratory Medicine, Tokyo Medical University



GlaxoSmithKlineK.K.
Do more, feel better, live longer

LXXT0006-P0807N
Issued in July 2008

คำนำ

เอกสารกำกับการใช้ยาเลคซีวา (LEXIVA)
(ยาใช้รับประทาน) ฉบับนี้อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของยา,
วิธีการใช้ยาและข้อควรระวังสำหรับผู้เริ่มใช้ยาเม็ดเลคซีวา 700
ในกรณีที่มีข้อกังวลใจ หรือเรื่องที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับยานี้
หรือเกี่ยวกับการรักษา กรุณาปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
เช่น แพทย์, เภสัชกร หรือนางพยาบาล
นอกจากนี้หากมีข้อสงสัย หรือสภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง
หลังการใช้ยา กรุณาอย่าหยุดการใช้ยา หรือลดปริมาณการ
ใช้ยาโดยพลการ กรุณาปรึกษาแพทย์
หากมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใด ไม่ต้องกังวลว่า
“จะถามเรื่องแบบนี้ได้หรือไม่” บุคลากรทางการแพทย์พร้อมที่
จะให้การสนับสนุนท่านอยู่ตลอดเวลา



ยาเม็ดเลคซีวา 700 คืออะไร

ชื่อทางการค้า ยาเม็ดเลคซีวา 700

ชื่อสามัญ โฟแซมพรีนาเวียร์แคลเซียมไฮดรต (FOSAMPRENAVIR Calcium Hydrate)
(ชื่อส่วนประกอบ)

ส่วนประกอบ ในยาเม็ดเลคซีวา 700 มีส่วนประกอบชื่อ โฟแซมพรีนาเวียร์แคลเซียมไฮดรต ซึ่งเมื่อเข้าไปภายในร่างกายแล้วจะเปลี่ยนเป็นสารชื่อ โฟแซมพรีนาเวียร์ ซึ่งมีผลในการต่อต้านไวรัส ในยาเม็ดเลคซีวา 700 1 เม็ดจะประกอบด้วยโฟแซมพรีนาเวียร์แคลเซียมไฮดรต ซึ่งมีโฟแซมพรีนาเวียร์ 700 กรัม

ประเภท เป็นยาประเภทที่เรียกว่ายับยั้ง HIV โปรตีเอส (HIV Protease Inhibitor) ต้องใช้ร่วมกับยารักษาโรคติดเชื้อ HIV ประเภทอื่น

ลักษณะภายนอก ยาเม็ดสีชมพู (ความยาวประมาณ 20.5 มิลลิเมตร) ด้านหน้ามีตัวอักษร “GXLL7” ประทับอยู่



(Actual size)



สรรพคุณ เป็นยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อ HIV มีสรรพคุณยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัส, ลดจำนวนไวรัสในกระแสเลือด, ยับยั้งการตกต่ำของภูมิคุ้มกันโรค

วิธีเก็บ เก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30°C) และหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

วิธีรับประทานยา

วิธีรับประทานยามี 3 วิธีดังต่อไปนี้ แพทย์จะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับท่านที่สุด กรุณารับประทานยาตามวิธีที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด



วิธีรับประทานยา วิธีที่ (1)

ยาเม็ดเลคซิวา 700 1 เม็ด และยาแคปซูลนอร์เวียร์ (NORVIR) (ชื่อสามัญ: ริโทนาเวียร์ RITONAVIR) 1 แคปซูล ทานพร้อมกัน วันละ 2 ครั้ง



วิธีรับประทานยา วิธีที่ (2)

ยาเม็ดเลคซิวา 700 2 เม็ด และยาแคปซูลนอร์เวียร์ (NORVIR) (ชื่อสามัญ: ริโทนาเวียร์ RITONAVIR) 2 แคปซูล ทานพร้อมกัน วันละ 1 ครั้ง



วิธีรับประทานยา วิธีที่ (3)

ยาเม็ดเลคซิวา 700 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง



หากมีเวลาที่กำหนดในการทานยา เช่น ก่อนอาหาร หลังอาหาร หรือในขณะท้องว่าง เวลาใดก็ได้แต่ต้องเป็นเวลาเดียวกันทุกวัน

รับประทานยาตอนกี่โมง

กรุณาปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์, เภสัชกรหรือนางพยาบาลว่า ควรจะรับประทานยาตอนกี่โมงของทุกๆวัน สิ่งที่สำคัญในการใช้ยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อ HIV คือ ต้องรับประทานยาต่อเนื่องในเวลาเดียวกันของทุกๆวัน ดังนั้นควรจะกำหนดเวลารับประทานยาให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของท่าน กรุณาบอกรูปแบบการใช้ชีวิตของท่านให้แพทย์ทราบเพื่อกำหนดเวลารับประทานยา สำหรับท่านที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตในวันธรรมดาและวันหยุดต่างกัน, กรุณาคำึงถึงจุดนี้ด้วย นอกจากนี้หากรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการเปลี่ยนงานหลังการใช้ยา ทำให้ไม่สามารถรับประทานยาในเวลาที่กำหนดไว้ได้ กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อเปลี่ยนเวลารับประทานยา

กรุณาอย่าตัดสินใจเองโดยพลการ

กรุณาอย่าหยุดการใช้ยาหรือลดปริมาณการใช้ยาโดยพลการเองด้วยเหตุ เช่น คิดเองว่าสภาพร่างกายดีขึ้นแล้ว ดังนั้นกรุณาปรึกษาแพทย์ นอกจากนี้หากมีผลข้างเคียงที่เป็นอุปสรรคในการรับประทานยา กรุณาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร



ในกรณีที่ลืมรับประทาน

ยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อ HIV จำเป็นต้องรับประทานในเวลาเดียวกันทุกๆวันอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ลืมรับประทานยา, กรุณารับประทานยาเป็นปริมาณ 1 ครั้งทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าหากนึกได้ในเวลาที่ใกล้กับเวลาที่รับประทานยาครั้งต่อไปแล้ว ให้งดรับประทานยาในครั้งที่ลืมแล้ว รับประทานยาปริมาณ 1 เม็ดในครั้งต่อไปเหมือนปกติ กรุณาอย่ารับประทานเป็นปริมาณ 2 เท่าในครั้งเดียวโดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยกรุณาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร การถามแพทย์หรือเภสัชกรว่าหากลืมรับประทานยาแล้วควรจะทำอย่างไรล่วงหน้าก่อนการใช้ยาจะช่วยให้ท่านสบายใจ

การใช้ยาร่วมกับอาหาร, เครื่องดื่มหรือยาชนิดอื่น

อาหาร

การรับประทานก่อนอาหาร, หลังอาหาร, ในขณะที่ท้องว่างหรือเวลาใดๆ ไม่มีผลต่อการใช้ยา ไม่มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารที่รับประทาน กรุณารับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของท่าน

ยาชนิดอื่น

มียาบางชนิดที่หากรับประทานพร้อมกันแล้วจะทำให้สภาพร่างกายแย่ลง ดังนั้นหากมียาซึ่งใช้อยู่เป็นประจำหรือต้องการใช้ยาแก้ปวดหรือยาชนิดอื่นๆ กรุณาปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนทุกครั้ง โดยเฉพาะยาที่แพทย์สั่งจ่าย ยาที่ทำซื้อเองตามร้านขายยาด้วยกันเช่นกัน กรุณาปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนทุกครั้ง

อาหารเสริมสุขภาพ · วิตามิน

มีบางชนิดที่หากรับประทานพร้อมกันแล้วจะทำให้สภาพร่างกายแย่ลง กรณีที่อยากทานร่วมกันให้ปฏิบัติเหมือนยาชนิดอื่นๆ คือ กรุณาปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนทุกครั้ง

ข้อมูลของท่านที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

สำหรับผู้ที่เคยทานยาและมีอาการแพ้ยา เช่น เกิดตุ่มตามผิวหนังหรือมีไข้ กรุณาแจ้งให้ทราบ

- หากกำลังตั้งครรภ์หรือกำลังอยู่ในช่วงให้น้ำนมบุตร กรุณาแจ้งให้ทราบ
- หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งให้ทราบ
- หากมียาหรืออาหารเสริมสุขภาพ วิตามินที่รับประทานเป็นประจำ กรุณาแจ้งให้ทราบ



ผลข้างเคียง

การใช้ยาอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ได้แล้วแต่บุคคล การเกิดผลข้างเคียงจะแตกต่างกันแล้วแต่บุคคล หากรู้สึกถึงความผิดปกติใดๆ กรุณาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรโดยทันที

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยาชนิดนี้มีดังต่อไปนี้
เกิดตุ่มขึ้นตามผิวหนัง, คัน, ปวดศีรษะ, อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (ท้องเสีย, คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดท้อง), รู้สึกเหนื่อยล้า เป็นต้น

อาการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นก็มี ดังนั้นหากรู้สึกถึงความผิดปกติใดๆ กรุณาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรโดยทันที

แม้ว่าไม่มีอาการใดๆ แสดงออกให้เห็นอาจจะเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับระบบการทำงานของตับและคลอเรสเตอรอลได้ ดังนั้นกรุณาทำการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเป็นประจำ

