

くすりのしおり

622036501

2010年12月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：レボレード錠 12.5mg

主成分：エルトロンボパグ オラミン（Eltrombopag olamine）

剤形：白色の錠剤、直径 7.9mm、厚さ 3.5mm

シート記載：（表）レボレード 12.5mg

（裏）REVOLADE12.5mg レボレード 12.5mg GSMZ112.5

GlaxoSmithKline



この薬の作用と効果について

血小板の産生に関わるトロンボポエチン受容体に働き、血小板数を増加させます。慢性特発性血小板減少性紫斑病の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。腎障害、肝障害がある。血栓塞栓症の素因がある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** << : 医療担当者記入 >>
- ・ 通常、成人は初回投与量 1 錠（エルトロンボパグとして 12.5mg）を 1 日 1 回、食事の前後 2 時間を避けて空腹時に服用します。血小板数・症状に応じて適宜増減されますが、1 日最高 4 錠（50mg）までとされています。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 服用予定時刻に飲み忘れてしまった場合は、その日は飲み忘れた分を服用しないでください。翌日は決められた錠数のみを服用し、絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・ 食事と一緒に服用するとくすりの作用を弱めることがありますので、食事の前後 2 時間は服用しないでください。
- ・ 牛乳などの乳製品やミネラル（鉄、カルシウム、アルミニウム、マグネシウム、セレン、亜鉛など）を含むサプリメントと一緒に服用するとくすりの作用を弱めることがありますので、くすりを服用する前後 4 時間はこれらの摂取を避けてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、疲労、頭痛、吐き気、白内障などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 全身倦怠感、食欲不振、吐き気 [肝機能障害]
- ・ 鼻血、歯ぐきの出血、皮下出血 [出血]
- ・ しびれ、めまい、一時的な片側麻痺 [血栓塞栓症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。